

ODBĚR STOLICE

Pokyny pro oddělení

Okulní (skryté) krvácení, OK

Neprovádět při užívání a ještě 3 týdny po vysazení antikoagulancií a nesteroidních antiflogistik, při makroskopické přítomnosti krve ve stolici, hematurii, u průjmů, menstruace (krátce před i po), po extrakci zubů, krvácení z nosu, dásní, hemoroidů.

3 dny před vyšetřením a během něho (obvykle další 3 dny) jí pacient stravu bohatou na balastní látky (zelenina, saláty, celozrnný chléb, ořechy), dostatek tekutin. Vynechat syrové nebo nedovařené maso, vnitřnosti a masné výrobky (tlačenka, tatarský biftek apod.), vynechat vitamín C nebo léky a nápoje, které jej obsahují.

Stolice se odebírá **3 dny po sobě** (1. odběr se uskuteční 4. den po zahájení předepsané diety).

Při odběru je třeba se vyhnout kontaminaci dezinfekčních prostředků (záchodová mísa) a moče (vyloučit ovlivnění výsledku případnou mikroskopickou hematurii). Po ukončení sběru doručit do laboratoře 3 označené testovací karty v PE sáčcích, vložené do obálky.

K potvrzení stačí pozitivita pouze 1 vzorku. U odběrů bez náležité diety a vynechání uvedených léků je průkazný pouze negativní výsledek. Z uvedených neplatí pro vitamin C (kys. askorbovou), který jako redukční činidlo může naopak způsobit falešně negativní výsledek.